

શ્વાસનળીનો સોજો અને RSV

આ સલાહ પત્રક તમારે ક્યારે ચિંતા કરવી જોઈએ અને ક્યાંથી મદદ મેળવવી તે અંગેની માહિતી આપે છે.



બાલ

જો તમારું બાળક નીચેની બાબતોમાંથી કોઈ પણ ધરાવતું હોય:

- ફિક્કા પડી જાય, ધબ્બા પડી જાય અને અડવાથી અસાધારણ રીતે ઠંડા લાગે
- તેઓ શ્વાસ લેતી વખતે વચ્ચે 10 સેકન્ડથી વધુ સમય સુધી અટકી જતા હોય, તેઓ **શ્વાસ બહાર કાઢે ત્યારે દરેક વખતે અસ્પષ્ટ અવાજ કરતા હોય** અથવા હોઠ ભૂરા હોય
- અક્કડ કે કડક થઈ જાય અથવા વારંવાર હાથ કે પગનું આંચકાયુક્ત હલનચલન કરે, જે તમે તેમને પકડો તો પણ અટકે નહિ (વાઈ કે આંચકી)
- અતિશય ઉશ્કેરાઈ જાય (ધ્યાન બીજે દોરવા છતાં આશ્વાસન ન આપી શકાય તે રીતે રડે), ગૂંચવાઈ જાય અથવા ખૂબ સુસ્ત બની જાય (જગાડવા મુશ્કેલ બની જાય)
- એવી ફોલ્લીઓ થાય કે જે દબાવવાથી દૂર થાય નહિ (**ગ્લાસ ટેસ્ટ**)
- 38° સે / 100.4° ફે અથવા તેથી વધુ તાપમાન સાથે 3 મહિનાથી ઓછી ઉંમર ધરાવતા હોય (સિવાય કે રસીકરણ પછી 48 કલાક સુધી તાવ આવતો હોય અને અન્ય કોઈ લાલ કે પીળી વિશેષતાઓ ન હોય)

તમારે તાત્કાલિક મદદની જરૂર છે.

સૌથી નજીકના હોસ્પિટલ **ઈમરજન્સી (A&E) ડિપાર્ટમેન્ટ** પર જાવ અથવા 999 પર ફોન કરો



પીળો

જો તમારું બાળક નીચેની વિશેષતાઓમાંથી કોઈ પણ ધરાવતું હોય:

- સતત ઝડપી શ્વાસ લેવા સહિત શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી; શ્વાસ લેતી વખતે તેમના નસકોરા પહોળા થાય અથવા **તેમની પાંસળીની નીચેના સ્નાયુઓ અંદર જાય**
- ખોરાક લેવામાં રસ ન ધરાવતા હોય અને/અથવા શરીરમાં પાણી ઓછું થઈ ગયેલું લાગે (મોં સુકાવું, આંખો ઊંડી ઉતરી જવી, આંસુ ન આવવા, ઘેનમાં હોવા, છેલ્લા 8 કલાકમાં બાળોતિયાં ભીના ન કરવા અથવા તાળવું પોચું પડી જવું (માથામાં પોચો ખાડો પડવો))
- ઘેન (વધુ પડતી ઊંઘ આવવી) માં અથવા ચીડિયા (તેમને રમકડાંથી, ટીવીથી, ખાવાનું આપીને કે તેડીને શાંત ન પાડી શકાતા હોય) રહેતા હોય – ખાસ કરીને તેમનો તાવ ઓછો થઈ જવા છતાં તેઓ ઘેનમાં કે ચીડિયા રહેતા હોય
- 39° સે / 102.2° ફે અથવા તેથી વધુ તાપમાન સાથે 3-6 મહિનાની ઉંમરના હોય (પરંતુ તેઓ રસીકરણ મેળવે પછી 2 દિવસ સુધી બાળકોમાં તાવ આવવો સામાન્ય છે) અથવા 5 થી વધુ દિવસ સુધી 38.0° સે અથવા તેનાથી વધુ તાવ આવવાનો ચાલુ રહે
- સ્થિતિ વધુ બગડતી જાય અથવા જો તમને ચિંતા થતી હોય

તમારે આજે જ તમારા ડોક્ટર અથવા નર્સનો સંપર્ક કરવાની જરૂર છે..

કૃપા કરીને તમારા GP સર્જરીને ફોન કરો અથવા NHS 111 પર કોલ કરો - 111 ડાયલ કરો

અમે જાણીએ છીએ કે વર્તમાન કોવિડ-19 ની કટોકટી દરમિયાન પરાકાષ્ટાના સમયે સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વ્યવસાયિકને મળવામાં વાર લાગી શકે છે. જો લક્ષણો 4 કલાક કે તેથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહે અને તમે

તમારા GP પ્રેક્ટિસના સ્ટાફના સભ્ય કે NHS 111 સ્ટાફ સાથે વાત ન કરી શક્યા હો તો ફરીથી તપાસ કરો કે તમારા બાળકે લાલ વિશેષતાઓ ન વિકસાવી હોય, કૃપા કરીને તમારા GP સર્જરીને ફોન કરો અથવા NHS 111 પર કોલ કરો -

111 ડાયલ કરો





લીલું

જો ઉપરની વિશેષતાઓમાંથી કોઈ પણ ન હોય

બાળક તેમનો શ્વાસ લેતી વખતે થોડી સેકંડ સુધી અટકી જાય અથવા ટૂંકા સમયગાળા સુધી ઝડપથી શ્વાસ લે તે સામાન્ય છે. 6 અઠવાડિયાંની ઉંમર સુધીમાં તેમની શ્વાસ લેવાની રીત વધુ નિયમિત હોવી જોઈએ.

નવજાત બાળકના રડવા વિશે અને કઈ રીતે સામનો કરવો તે અંગે વધારાની માહિતી ઉપલબ્ધ છે

– અહીં ક્લિક કરો

સ્વ-સંભાળ

તમારા બાળકની ઘર પર સંભાળ લેવાનું યાલુ રાખો. જો તમને હજુ પણ તમારા બાળક વિશે ચિંતા હોય તો તમારા સ્વાસ્થ્ય મુલાકાતીનો સંપર્ક કરો અથવા NHS 111 પર કોલ કરો – 111 ડાયલ કરો

Translated by: Newham Language Shop

Peer reviewed date:

Request:

